

# Fresco®

Meesterlijk in onkruidbestrijding

**MULTI  
FLEX**  
herbicide



**BELCHIM**  
CROP PROTECTION

- breed werkingspectrum
- uniek werkingsmechanisme
- mengbaar met alle partners
- de basis voor elk schema

## Producteigenschappen en toelating

- Samenstelling: 400 g/l metobromuron
- Formulering: suspensieconcentraat (SC)
- Toegelaten in: anemoon, hyacint, iris, lelie, narcis, muscari en zantedeschia (Artikel 51 (KUG) toelating\*)
- Dosering: 1,25-2,5 l/ha (afh. van grondsoort)
- Aantal toepassingen: 1 per 12 maanden
- Toelatingsnummer: 15806 N

## Breed werkingspectrum

Zeer gevoelig	Gevoelig	Matig gevoelig
Herderstasje	Amarant	Duivenkervel
Melganzenvoet	Klein kruiskruid	Zwarte nachtschade
Korrelganzenvoet	Uitstaande melde	Ereprijs
Paarse dovenetel	Doornappel	Vingergras
Hoenderbeet	Varkensgras	
Kamille	Zwaluw tong	Weinig gevoelig
Knopkruid	Kleine brandnetel	Akkerviooltje
	Perzikkruid	Kleefkruid
	Hanenpoot	Bingelkruid
	Naaldaar	Hondspeterselie
	Duist	



## Toepassing in bloembollen

Voorjaarsbloeiers	Dosering per ha	Type toepassing (1 per 12 maanden)	Keuze toepassingsmoment 1 toepassing	
			voor 'dikdek' stro	na strodek afhalen
Anemoon	(nog) geen ervaring	voor opkomst		
Hyacint	2 - 2,5 L	voor opkomst	ja	nee ; ja bij geen opkomst
Iris	2 - 2,5 L	voor opkomst	ja	nee
Muscari	2 - 2,5 L	voor opkomst	ja	nee ; ja bij geen opkomst
Narcis	2 - 2,5 L	voor opkomst	ja	nee ; ja bij geen opkomst

Zomerbloeiers	Dosering per ha	Type toepassing (1 per 12 maanden)
Zantedeschia (knollen)	2 - 2,5 L	voor opkomst
Lelie (plantgoed)	2 - 2,5 L	voor opkomst
Lelie (kale schubben)	(nog) geen ervaring	voor opkomst

Tabel op basis van onderzoek uitgevoerd van 2011 t/m 2018.

### Aanbevelingen

- Voor opkomst van het gewas toepassen op een bezakte vochtige grond
- Op zeer lichte (zand)grond met weinig organische stof: lagere dosering gebruiken (1,25-2 l/ha)
- Screenings met Fresco in de toegelaten teelten zijn positief geweest, maar door de grote variatie in het bloembollen- en bloemknollenassortiment is het desondanks toch raadzaam om bij twijfel eerst zelf ervaring op te doen.
- Fresco is zowel alleen getest als in combinatie met andere herbiciden die worden toegepast in bloembollen en -knollen zoals: glyfosaat, chloor IPC, Stomp 400 SC, Wing P, Pyramin DF, Dual Gold.
- Maak een brede herbicidemix voor een complete onkruidbestrijding!

\* Artikel 51 (KUG) toelating: Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Volgteelten: In verband met residuen in volggewassen, direct na het mislukken van de teelt alleen aardappelen en wortel- en knoigewassen telen. Na 4 maanden na toepassen mogen ook bieten, bladgroenten, granen en maïs worden geteeld. Eén jaar na toepassen mogen alle gewassen worden geteeld.

