



Ranman Top bedekte teelt

In de loop van augustus zien we de kans op *Phytophthora* en valse meeldauw in diverse vruchtgroenten weer toenemen. Sinds kort is er de mogelijkheid om met Ranman Top deze problemen succesvol het hoofd te bieden.

Ranman Top

Ranman Top is een preventief fungicide met een werking op waterschimmels (o.a. *Phytophthora*, *Pythium* en valse meeldauw). De werkzame stof doodt sporen, doodt mycelium en voorkomt dat sporen en zwemsporen het blad kunnen infecteren. Omdat het middel in het blad minder goed werkt, kunnen er na een behandeling nog infectieplekken zichtbaar worden. Een herhaalde toepassing kan noodzakelijk zijn. De werkzame stof van Ranman Top heeft geen negatief effect op nuttigen.

Phytophthora

Phytophthora in tomaat is een regelmatig terugkerend probleem. Zeker vanaf augustus zien we de druk toenemen vanwege veranderende weeromstandigheden. Een tijdige toepassing van Ranman Top kan een *Phytophthora*-infectie tot stoppen brengen. Om de cyclus te doorbreken kunnen meerdere toepassingen nodig zijn.

Valse meeldauw

Valse meeldauw in komkommerachtigen (*Pseudoperonospora cubensis*) komt in Nederland niet veel voor, hoofdzakelijk vanwege gebruik van tolerante rassen. Wanneer de omstandigheden zeer ongunstig zijn kan valse meeldauw toch om zich heen grijpen. Een tijdige toepassing van Ranman Top is dan noodzakelijk. Om de cyclus te doorbreken zijn 2 of meer toepassingen nodig.

Ruimtebehandeling

De eerste ervaringen met Ranman Top toegepast door middel van een ruimtebehandeling zijn zeer positief. Naast de uitstekende sporendodende werking heeft een ruimtebehandeling als voordeel dat het gewas niet nat wordt. Met deze toepassingstechniek adviseren we ook 0,5l/ha per hectare te gebruiken.

Toepassing

Voor tomaat, aubergine en Cucurbitaceae met eetbare schil:

42ml/100l met een maximum van 0,5l Ranman Top per hectare.

- Herhalen na 7 tot 10 dagen.
- Maximaal 6 toepassingen per 12 maanden.
- Veiligheidstermijn voor de oogst is minimaal 3 dagen



Ranman
TOP

Nu ook als **2 liter** verpakking

Het gebruik in de bedekte teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil, aubergine en tomaat is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Klik hier voor meer info over onze producten : www.belchim.nl